

지하부 **굼벵이**와
지상부 **나방유충**
동시방제로
효과적인 골프장 해충관리

- **품목명 및 함량** 브로플라닐라이드 25%
- **약효보증기간** 4년
- **독성** 저독성농약
- **계통** Meta-diamide (30 *new)
- **포장단위** 100ml

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해충	사용적기 및 방법	희석배수	㎡당 사용량
잔디	등얼룩풍뎅이	유충 발생 초기 토양관주처리	20,000배(1L/㎡)	0.05ml
	잔디포충나방	발생 초기 경엽처리	10,000배(200ml/㎡)	0.02ml
	검거세미밤나방	유충 발생 초기 경엽처리		

! 효과적인 사용방법

약제 살포 후 강우 및 과습으로 인한 이슬 맺힘이 예상되는 상황에서는
고착효과가 있는 보조제를 혼용하십시오.

동방아그로 소비자 상담전화 : 1644-7337 www.dongbangagro.co.kr

서울특별시 관악구 남부순환로 2028(남현동) 동방빌딩 (주)동방아그로 I TEL : 02-580-3600 FAX : 02-523-3505 I 사내기술정보 202310

신드롬액상수화제
제품정보 QR코드

잔디 전문 살충제



검거세미밤나방 등얼룩풍뎅이 잔디포충나방

신드롬

액상수화제


동방아그로


빈틈없는 효과


새로운 작용기작

▶ 저항성나방까지 완벽 방제










정상적인 신경정보전달로 건전



비정상적인 신경전달로 인해 경련, 구토, 마비

GABA 수용체에 결합

구조변형 유도 / Cl¯ 이온 차단 / 자극억제신호 방해



강한빠른 효과

빠른 증상 & 빠른 치사

▶ 방제효과는 등록시험 성적 기준







2시간 ~ 6시간 경련 및 이상행동 / 6시간 ~ 12시간 완전치사 (*나방유충)

저온·저농도에서 강한효과






ⓘ 나방활성이 낮은 저온에서 효과 우수 / 저농도에서도 강한 효과(지속효과의 원동력)

오래가는 효과

높은 광안전성


ⓘ 신드롬의 높은 광안전성이 약제 잔효력의 차이를 만듭니다.



▶ 시험방법 : 유리 샬레에 빛을 투과시키는 방법으로 약제 살포 직후, 8시간, 24시간 후의 약제 잔존율을 측정

뛰어난 내우성

ⓘ 잔디의 경우 강우 및 이슬에 씻겨 내려가지 않는 약제선택이 중요



▶ 시험방법 : · 약제를 핸드스프레이로 살포한 후 30분, 1시간, 4시간 후에 20mm/30분의 인공강우 살수
· 약제 살포 2, 8, 15일 후에 잎을 잘라 배추좀나방 3령 유충을 접종하고 3~4일 후에 반응율 조사