

# 각지벌레 방제, 마일스톤으로 끝내버리자!

## 마일스톤

입상수화제

1. 약충/성충 접촉독과 섭식독 동시가능 + 성충 불임효과

2. 각지벌레 뿐만 아니라 총채벌레, 선녀벌레 등록  
5~8월 시기에 맞춰서 동시 방제 가능

3. 침투이행성 우수하며 탁월한 약효지속



### 적용대상

- [감귤] 화살각지벌레, 루비각지벌레, 볼록총채벌레
- [배] 가루각지벌레, 꼬마배나무이, 미국선녀벌레
- [복숭아] 뽕나무각지벌레
- [인삼] 가루각지벌레, 파총채벌레, 미국선녀벌레



소비자상담전화: 1644-7337 | [www.dongbangagro.co.kr](http://www.dongbangagro.co.kr)



마일스톤 입상수화제  
제품정보 QR코드

- 사용 전에 표기내용을 잘 읽을 것 ● 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것 ● 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것
- 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 '농약관리법'에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

# 마일스톤

입상수화제

## 적용해충



배 가루깍지벌레



배 미국선녀벌레



배 꼬마배나무이



복숭아 뽕나무깍지벌레



인삼 가루깍지벌레



인삼 파총채벌레



인삼 미국선녀벌레



감귤 화살깍지벌레



감귤 루비깍지벌레



감귤 볼록총채벌레

## 깍지벌레 약충의 밀도가 늘어나기 전에 꼭 처리하세요!

	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
배 가루깍지벌레		▲ 1차방제		▲ 2차방제	▲ 3차방제		
복숭아 뽕나무깍지벌레		▲ 1차방제	▲ 2차방제		▲ 3차방제		
감귤 화살깍지벌레		▲ 1차방제		▲ 2차방제			

[표시된 색이 진할수록 약충의 밀도가 높은 시기입니다. 해충발생시기는 당해년도 기온에 따라 달라질 수 있습니다.]