



산림해충 날려버려

아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 분산성액제 10(8+2)%

크레모아

더욱 빠르고 확실한 효과!
소나무, 곰솔, 잣나무
소나무재선충 및 매개충
(북방수염하늘소, 솔수염하늘소)
동시방제!

● 품목명: 아세타미프리드 - 8% + 에마멕틴벤조에이트 - 2% ● 독성: 보통독성, 어독성 II 급 ● 작용기작: 4a+6

1. 천공



목재용 드릴 날 10mm(직경)를
이용하여 깊이 7~10cm 천공

[천공 방향]



밀을 향해 45.


나무줄기에 고루 분포시키고
중심부를 비켜서 뚫음

2. 약제 주입



천공한 곳에 5ml씩
주입합니다.

[천공 당 약제주입량]



직경 1cm 드릴 날 사용

3. 약제 투입 후 흔적




약제 시공 후 시인성

작업 시 적색 흔적이 남아
약제 투입 여부 확인 가능

제품내 색소를 첨가 ▶ **시인성 강화**(약제처리 오류방지 : 중복처리 또는 천공후 약제 미처리)

대상병해충 및 사용량

작물명	대상병해충	사용적기 및 방법	사용량
소나무	소나무재선충	1~2월 원액 나무주사	원액 1mL/cm (흉고직경)
	솔수염하늘소	성충 우화전 원액나무주사	
	솔잎혹파리	성충 우화기 나무주사	
곰솔	소나무재선충	1~2월 원액 나무주사	
	솔수염하늘소	성충 우화전 원액나무주사	
잣나무	소나무재선충	1~2월 원액 나무주사	
	북방수염하늘소	성충 우화전 원액나무주사	



소나무와 곰솔 차이점 - 크레모아 곰솔(소나무 포함) 등록

소나무 (내륙성)	
나무껍질(수피)	겨울꽃 색깔
적갈색	적갈색

곰솔 (중부이남의 해안과 연안에 분포, 해안성)	
나무껍질(수피)	겨울꽃 색깔
검은색	은백색

크레모아 장점

적용 다양성	시인성 보장
■ 소나무재선충, 매개충(솔수염하늘소, 북방수염하늘소) 동시방제, 솔잎혹파리 등록 ■ 분포 : 소나무, 잣나무(내륙에 분포) 곰솔(중부이남 해안과 연안)	■ 제품에 적색 색소를 첨가 → 미처리나 중복처리 방제에 효과적

주의사항

1. 수관부가 발달한 대형목은 사용량을 50% 범위 내에서 적절히 증가시켜 주십시오.
2. 수고가 낮은 반송, 다행송, 조경송인 경우 약제가 한가지에 몰릴수 있으므로 사용을 자제하여 주십시오.
3. 나무 흉고 직경이 8cm이하인 경우 사용하지 마십시오.
4. 수세가 불량하거나 강전정을 시행한 나무의 경우, 반드시 전문가의 지도를 받아 약량을 조절하십시오.



반송



다행송



조형송



강전정

