

세상에 없던
강력한 신규 살균제

버픽스



액상수화제

- ▶ **신규물질, 신규계통**
신규물질, 신규계통으로 기존 저항성이 발생한 병해에도 매우 효과적입니다.
- ▶ **뛰어난 침달성, 침투이행성**
침달성과 침투이행성이 뛰어나 예방과 치료를 동시에 할 수 있습니다.
- ▶ **광범위한 적용 작물과 병해**
탄저병, 흰가루병, 잣빛곰팡이병 등 자낭균류 타겟 넓은 살균 스펙트럼과 다양한 작물에 사용 가능합니다.
- ▶ **약해와 혼용에 안전**
작물 안전성이 뛰어나 약해 걱정없고 타 약제와 혼용이 용이하여 편안하게 사용하실 수 있습니다.

NEW

품목명 : 플로릴피록사미드 - 10% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위 : 100mL x 100EA, 250mL x 40EA | 작용기작 : 다4

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
감(단감 포함)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	3회 이내	
고추(단고추류 포함)	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전		
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
	흰가루병					
딸기	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	100mℓ/10a	수확 7일 전		
	흰가루병					
마늘	흑색썩음균핵병	월동 후 10일 간격 경엽처리				발병 초 10일 간격 경엽처리
	잎마름병(무인항공기/드론)					
멜론	흰가루병					
복숭아	잿빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전		
사과	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 3일 전		
상추(양상추 포함)	균핵병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전		
수박(복수박 포함)	덩굴마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전		
양파	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 7일 전			
오이	흰가루병		수확 3일 전			
인삼	점무늬병		수확 7일 전			
장미	흰가루병	발병 초 경엽처리	-	-		
참외			수확 3일 전			
콩	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	100mℓ/10a	수확 7일 전	3회 이내	
	점무늬병(무인항공기/드론)					
토마토(방울토마토 포함)	잎곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전		
	잿빛곰팡이병					




원예용
살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
토마토 (방울토마토 포함)	흰가루병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전	3회 이내
포도	잣빛곰팡이병				
호박 (단호박 포함)	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리			

작용기작

버픽스는 신규 Picolinamide계통으로 병원균의 미토콘드리아 내부 호흡 복합체3의 퀴논 내측에서 기능을 저해하여 에너지 생성을 막아 병원균을 치사시킵니다.



침달성과 침투이행성



원예용
살균제