

개화기에도 안전한

# 어워드



입상수화제

- ▶ 예방과 치료를 동시에
- ▶ 침달성, 침투이행성, 내우성, 지속성
- ▶ 개화기에 사용할 수 있는 안전한 농약

NEW

품목명: 이프플루페노퀸 (10)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 250g x 40EA | 작용기작: 가5

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
배 복숭아 자두	검은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	3회 이내
	갯빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
		발병 초 경엽처리		수확 3일 전	

## 처리시기별 배 약해조사

### 작물 전 생육기에 안전



약제처리 시기	인편 탈락기	개화 전	개화기	수분 후	적과기	신초 신장기	신초신장 정지기	과실 비대기
조사 부위	잎, 꽃눈	잎, 꽃눈	잎, 꽃, 과실	잎, 꽃, 과실	잎, 과실	잎, 과실	잎, 과실	잎, 과실
약해	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
약흔	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

\* NF-180 SC 2,000배 / 넛소반다이필드리서치센터 / 품종: 신고, 신흥, 장심랑, 남수, 이십세기



원예용 살균제