

수도의도열병과세균벼알마름병을한번에

항생제 계통의 약제로 도열병 및 세균벼알마름병의
예방 및 치료에 효과
빠른 침투이행으로 내우성이 좋아 장마철에도 우수한 효과

가스가민

액제



품목명: 가스가마이신 (2.3)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 500ml x 20EA, 5 l x 4EA | 작용기작: 라3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20 l당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	갈색잎마름병	이삭패기 직 전 및 이삭팬 후 경엽처리	20ml	수확 14일 전	5회 이내
	목도열병	발병직전 또는 발병초기 경엽처리			
	세균벼알마름병	출수직전부터 7일 간격 경엽처리			
	이삭도열병	이삭패기 직전부터 수전기 경엽처리			
	앞도열병	본논초기: 발병직전 또는 발병초기 경엽처리			
배추	무름병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	4회 이내



수도용 살균제

효과적인 사용방법

- 이 농약은 장마철에는 비가 멈춘 틈을 타서 약을 뿌려 방제시기를 놓치지 않도록 하십시오.
- 이삭도열병은 이삭패기 직전부터 80%떨 때(수전기) 사이에 1,000㎡ (10a)당 140~160 l 를 뿌리십시오.
- 앞도열병: 발생될 우려가 있거나 병무늬가 나타나는 초기에 희석액을 1,000㎡ (10a)당 본 논 초기에는 80~100 l 를, 본 논 중기 및 후기에는 140~160 l 를 뿌리십시오.

주의사항

- 이 농약은 영하 5도(°C) 이하에서는 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하 5도(°C) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.