

균핵탄

입제



세균병, 곰팡이병 동시방제
 생육초기 병해 예방 전문
 카군 살균제 혼용시 상승효과 UP

품목명 : 메트코나졸 (0.75)% | 약효보증기간 : 3년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 3kg x 8EA | 작용기작 : 사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고구마	균핵병	종서파종 전 토양처리	6kg	정식기	1회 이내
당근		파종·정식기 토양처리		파종기	
땅콩	파종(정식) 전 토양처리	파종(정식)기			
마늘	흑색썩음균핵병			종구 파종직전 토양처리	
순무양배추(콜라비)	균핵병	파종(정식) 전 토양처리		파종기	
양파	흑색썩음균핵병	정식 전 토양처리		발생초기	-
우엉	균핵병	파종(정식) 전 토양처리		정식기	1회 이내
잔디	동전마름병	발병 초 10일 간격 토양처리		파종(정식)기	
파(쪽파 포함)	흑색썩음균핵병	정식 전 토양처리			
향미나리(파슬리)	균핵병	정식(파종)기 토양처리			

방제효과 시험

마늘 흑색썩음균핵병 (2008, 동방아그로 기술연구소)



양파 흑색썩음균핵병 (2008, 신젠타코리아)



마늘 흑색썩음균핵병 (2008, 순천대학교)



양파 흑색썩음균핵병 (2008, 대구대학교)



효과적인 사용방법

- 마늘 종구파종 직전에 골고루 살포 후 종구를 파종하십시오.
- 양파 정식 전에 골고루 살포 후 정식 하십시오.