

# 가루이 전문 약제

동방아그로



입상수화제



- ▶ 2종에 가루이 전문약제 합제  
피리다벤과 피리플루퀴나존 두가지 성분의 상승효과
- ▶ 성충 및 유충 밀도 억제효과 우수
- ▶ 엑시렐(관주, 침지처리 약제)과 체계 처리로 가루이류 효과적 방제

품목명 : 피리다벤 + 피리플루퀴나존 (20+5) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위 : 100g, 250g | 작용기작 : 21a+9b

## 적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가지	담배가루이	발생 초 7일 간격 경엽처리	10g	수확 3일 전	2회 이내
고추 (단고추류 포함)				수확 2일 전	
딸기				수확 3일 전	
멜론				수확 7일 전	
수박 (복수박 포함)				수확 2일 전	-
오이				발생 초기	
장미				수확 2일 전	
참외	온실가루이			수확 3일 전	2회 이내
토마토 (방울토마토 포함)				수확 5일 전	
호박 (단호박 포함)					



원예용  
살충제

170 | 동방아그로 빅다운 입상수화제

## 가루이 새로운 강적


### 담배가루이



▲ 성충



▲ 유충



▲ 알

### 온실가루이



▲ 성충



▲ 알

가루이는 작물을 흡즙하여 수확에 악영향을 주고, 배설물로 인한 그을음병을 유발하여 2차 피해가 나타나며 특히 담배가루이는 토마토에서는 황화잎말림 바이러스 (TYLCV) 전파하는 매개충으로 농작물에 큰 피해를 준다.

담배가루이 피해 증상



황화 잎말림바이러스



토마토



참외



오이



원예용 살충제

넙다운살포 후 가루이 모습



30분 경과



171 | 동방이그르넙다운 입상수화제

**Tip** 엑시렐 유현탁제 관수와 병행하시면 효과를 높일 수 있습니다.



← 엑시렐 유현탁제 사용 사례 (유튜브 영상)

