

혼용이 용이한 저온기 응애약

저온기 응애 방제효과 우수  
일 평균 기온이 낮은 봄, 가을 효과적 방제

나방 저령기 초기 방제  
나방 전문약제 효과 보조

진딧물류에 살충 스펙트럼  
진딧물 전문약제 효과 보조

# 다니톨

유제



품목명: 펜프로파트린 (5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 500mL x 20EA | 작용기작: 3a

### 적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20L당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감귤	굴굴나방	피해발생초기(개화기간제외) 경엽처리	20mL	수확 7일 전	3회 이내
	굴녹응애	발생초기 경엽처리		수확 7일 전	
	굴응애				
강활	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생할 때 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
갯기름나물 (방풍)	차응애	발생초기 경엽처리		수확 5일 전	
당귀 (뿌리)	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생할 때 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
더덕	차응애	발생초기 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
독활 (땅두릅)					
딸기	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생할 때 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
레몬	차면지응애	발생초기 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
망고			수확 7일 전		
배	응애 (점박이응애)	발생초기(5~10월) 한잎당 2~3마리정도 발생할 때 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
백지	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생할 때 경엽처리	수확 21일 전		2회 이내
사과	사과응애	발생초기(5~10월) 한잎당 2~3마리정도 발생할 때 경엽처리	20mL	수확 7일 전	3회 이내
	점박이응애	발생초기(5~10월) 한잎당 2~3마리정도 발생할 때			
	진딧물 (조팝나무진딧물, 사과혹진딧물)				
수박	진딧물 (복숭아혹진딧물, 목화진딧물)			수확 3일 전	
쑥	진딧물류				
오렌지	차면지응애	발생초기 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
유자					
익소라	점박이응애			발생초기	-
장미	짙레수염진딧물				-
차나무	차응애			수확 14일 전	2회 이내
참외	담배가루이	발생초기 7일 간격 경엽처리	수확 3일 전		
토마토	온실가루이	발생초기 10일 간격 경엽처리	40mL	수확 7일 전	
패션프루트	차면지응애	발생초기 경엽처리	20mL		



165 | 다니톨 유제