

예방 및 치료 효과가 우수한 과수 종합 살균제

리스펙트

입상수화제



예방 및 치료 효과를 겸비한 종합살균제
탄저병을 비롯한 과수 종합 살균제
침투이행 효과가 있어 내우성이 우수하고 약효 지속 기간이 김
다양한 작용기작으로 저항성 균에도 효과 우수

품목명: 디티아논 + 메트코나졸 (30+5) % | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 500g x 20EA | 작용기작: 카+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감귤	검은점무늬병	6월 상순부터 2주 간격 경엽처리	20g	수확 7일 전	4회 이내
	더듬이병	춘지발생 초 15일 간격 경엽처리			
	잿빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
고추 (단고추류 포함)	탄저병		13.3g	수확 2일 전	3회 이내
매실	검은별무늬병	4월 중순부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
배	검은별무늬병		발병 초 10일 간격 경엽처리		
	붉은별무늬병				
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리	13.3g	수확 14일 전	4회 이내
	잿빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
사과	갈색무늬병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리			
	검무늬씩음병				
	점무늬낙엽병				
포도	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	3회 이내
		발병 초 10일 간격 경엽처리			



원예용 살균제

101 | 리스펙트 입상수화제

리스펙트 입상수화제 특징

- 넓은 항균활성
 - 사과, 배, 감귤 등 과수의 주요 병해에 높은 활성
 - 복숭아 세균구멍병과 같은 세균 병해에도 효과
- 보호 효과가 뛰어남
 - 포자 발아를 강하게 저해하여 우수한 보호 효과를 보임
- 내우성이 뛰어남
 - 내우성이 뛰어나 잔효성이 우수한 약제
- 내성균 발현 우려가 적은 약제
 - 타약제의 효과가 저하된 지역에서도 안정적 효과

리스펙트 입상수화제 효과



효과적인 사용방법

- 사용 약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.