

리조렉스

수화제



- ▶ 토양 병해에 대한 우수한 효과
토양 중에서 발생하는 병해에 우수한 방제 효과
- ▶ 토양중에서 안정된 효과
토양 흡착력이 강하여 강우 등에 의한 이동성이 매우 적어 안정적인 효과 발휘
- ▶ 긴 잔효성
토양 관주 처리시 30~45일 정도 오랫동안 약효 지속

품목명 : 톨클로포스메틸 (50) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 200g x 80EA, 1kg x 20EA | 작용기작 : 바3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	1,000㎡ (10a)당 사용약량	안전사용 기준	
					시기	횟수
감자	검은무늬썩음병	파종 전 침지처리	400g	-	파종기	1회 이내
멜론	검은점뿌리썩음병	정식직후 10일 간격 주원처리	40g	3ℓ / ㎡	수확 30일 전	3회 이내
사과	자주날개무늬병	5월 중순 관주처리	20g	40ℓ / ㎡	수확 45일 전	2회 이내
잔디	라이족토니아마름병	발병 초부터 7일 간격 관주처리	40g	1ℓ / ㎡	발생초기	-
	설부소립균핵병	적설직전 10일 간격 관주처리	20g			-

작용기작

- ▶ 균사 세포의 내용물을 유출시켜 사멸시키는 작용
- ▶ 세포 분열의 제어 기능을 교란하여 분열을 정지시켜 사멸시키는 작용
- ▶ 조균류 유주자의 유영운동을 저해시키는 작용

원예용
살균제