

과수 깍지벌레를 속시원히 해결



입상수화제



**깍지벌레에 뛰어난 효과**  
인삼 깍지벌레 및 감귤, 배, 복숭아 등 과수 깍지벌레 방제 전문약제

**깍지벌레에 장기간 효과 지속**  
약충방제 및 산란억제로 뛰어난 밀도 억제

**총채벌레 및 미국선녀벌레 동시 방제**  
인삼 파총채벌레 효과 탁월

품목명: 벤퓨라카브 + 뷰프로페진 (20+20)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 II 급 | 포장단위: 330g x 40EA | 작용기작: 1a+16

적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감귤	루비깍지벌레	발생 초부터(약충) 경엽처리	13.3g	수확 14일 전	3회 이내
	볼록총채벌레	발생 초부터 경엽처리			
	화살깍지벌레	다발생기 경엽처리			
배	가루깍지벌레			수확 30일 전	2회 이내
	꼬마배나무이				
	미국선녀벌레				
복숭아	뽕나무깍지벌레	발생 초부터	13.3g	수확 30일 전	3회 이내
인삼	가루깍지벌레	발생 초부터			
	미국선녀벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	파총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			



원예용  
살충제

175 | 마일스톤 입상수화제

작물/해충별 방제가

작물명	적용해충	시험장소	방제가
감귤	화살깍지벌레	제주도	★★★★ (약효 90% 이상)
배	가루깍지벌레	전남 나주	★★★★
	꼬마배나무이	전북 남원	★★★★
복숭아	뽕나무깍지벌레	충남 논산	★★★★
인삼	파총채벌레	충남 금산	★★★★

주의사항

- 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 살포 후 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.