

새로운 잿빛곰팡이병 전문약

보트리사이드

액상수화제



- ▶ 강력한 잿빛곰팡이병 전문 살균제
기존의 내성이 생긴 잿빛곰팡이병 방제에 효과적
- ▶ 뛰어난 침달성과 침투이행성
약제에 접촉되지 않은 부분까지 약 성분이 고르게 이행되어 안정적인 효과 발휘
- ▶ 예방효과와 치료효과를 겸비

품목명: 페니라자민 (30%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 100mL x 50EA, 200mL x 40EA, 500mL x 20EA, 1L x 15EA | 작용기작: 사3

적용 병해 및 사용량

| 작물명 | 적용 병해 | 사용시기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 안전사용기준 | |
|-------------|--------|------------------|-----------------------------|----------|---------|
| | | | | 시기 | 횟수 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초 10일 간격 경엽처리 | 20mℓ | 수확 7일 전 | 4회 이내 |
| 고추(단고추류 포함) | | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | | | 3회 이내 |
| 근대 | | 발병 초 경엽처리 | | 발생초기 | - |
| 글라디올러스 | | | | 수확 7일 전 | 4회 이내 |
| 금감(금귤) | | | | 발생초기 | - |
| 꽃기린 | 잿빛무늬병 | 개화 전 및 낙화 후 경엽처리 | 20mℓ (1ℓ / m ²) | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 나디아 | 균핵병 | 발병 초 경엽처리 | 20mℓ | 파종기 | 1회 이내 |
| 당근 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
| 대추 | | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 수확 7일 전 | | |
| 들깨(잎) | 꽃곰팡이병 | 개화직전부터 경엽처리 | 수확 2일 전 | 3회 이내 | |
| 딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 수확 14일 전 | | |
| 레몬 | | 발병 초 경엽처리 | 수확 7일 전 | | |
| 망고 | | | 수확 5일 전 | | |
| 무화과 | | | | | 수확 7일 전 |
| 바질 | | | 수확 14일 전 | | |
| 복분자 | 잿빛무늬병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 20mℓ | 수확 7일 전 | 4회 이내 |
| 복숭아 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초 경엽처리 | 수확 3일 전 | | |
| 부추 | | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 수확 7일 전 | | |
| 블루베리 | | 발병 초 경엽처리 | 수확 7일 전 | | |
| 비름 | | 발병 초 경엽처리 | 수확 5일 전 | | |
| 산딸기 | | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 수확 7일 전 | | |
| 산마늘 | 균핵병 | 발병 초 경엽처리 | 수확 2일 전 | 3회 이내 | |
| 상추(양상추 포함) | | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 수확 7일 전 | | |
| 수박(복수박 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초 경엽처리 | 20mℓ | | 발생초기 |
| 안개초 | | | | | |



원예용 살균제

| 작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 안전사용기준 | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------|
| | | | | 시기 | 횟수 |
| 양행두(체리) | 잣빛곰팡이병 | 발병 초 경엽처리 | 20mℓ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| | 잣빛무늬병 | 개화 전 및 낙화 후 경엽처리 | | | |
| 양파 | 잣빛곰팡이병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
| 오미자 | | | | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
| 오이 | | | | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
| 유자 | | 발병 초 경엽처리 | | 수확 14일 전 | |
| 인삼 | | 발병 직전 7일 간격 경엽처리 | | 수확 40일 전 | |
| 자두 | | 잣빛무늬병 | | 발병 초 경엽처리 | 수확 7일 전 |
| 참나물(파드득나물) | 개화 전 및 낙화 후 경엽처리 | | | | |
| 참다래(키위) | 잣빛곰팡이병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | | 수확 30일 전 | 3회 이내 |
| 참외 | | 발병 초 10일 간격 경엽처리 | | | |
| 청경채 | 균핵병 | 발병 초 경엽처리 | | 수확 2일 전 | |
| 취나물 | 잣빛곰팡이병 | | | | |
| 치커리 | | | | | |
| 케일 | | | | | |
| 토마토(방울토마토 포함) | | | | | |
| 파(쪽파 포함) | 잣빛곰팡이병 | 발병 초 경엽처리 | | 수확 2일 전 | |
| 파파야 | | | | 수확 7일 전 | |
| 포도 | | | | 수확 3일 전 | |
| 플럼코트 | 잣빛무늬병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
| 호박 | 잣빛곰팡이병 | 개화 전 및 낙화 후 경엽처리 | 수확 7일 전 | 2회 이내 | |
| | 잣빛곰팡이병 | 발병 초 7일 간격 경엽처리 | 수확 5일 전 | 3회 이내 | |



보트리사이드 약효비교

| 구분 | 작물 | 보트리사이드 | A약제 |
|--------------------|----|--------|-----|
| Preventive (예방) | 오이 | *** | *** |
| | 포도 | *** | *** |
| Curative (치료) | 오이 | *** | * |
| | 포도 | *** | * |
| Translaminar (침달) | 오이 | *** | ** |
| Rainfastness (내우성) | 포도 | ** | * |

