

# 블루오션

액상수화제



- ▶ **원예용 종합살균제**  
 각종 원예작물의 흰가루병, 잿빛곰팡이병, 잎곰팡이병 등을 동시에 방제
- ▶ **저항성 곰팡이 방제에 효과적**  
 서로 다른 2가지 성분을 가지고 있어 저항성 관리에 효과적
- ▶ **강력한 치료효과와 오랜 약효 지속성**

품목명 : 플루사피록사드 + 메트라페논 (8+9.1)% | 약효보장기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위 : 100mL x 50EA, 200mL x 40EA, 1L x 15EA | 작용기작 : 다2+나6

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20 L당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가지	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mL	수확 3일 전	3회 이내
	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
감 (단감 포함)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	8mL	수확 21일 전	
갯 갯기름나물 (방풍) 고들빼기	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
				수확 14일 전	
고추 (단고추류 포함)	갈색점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 3일 전	3회 이내
	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	
딸기	꽃곰팡이병	개화직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
민들레	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
배	검은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	8mL	수확 21일 전	3회 이내
	붉은별무늬병				
복숭아	잿빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
사과	잿빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	10mL	수확 7일 전	2회 이내
	갈색무늬병 점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리	8mL	수확 21일 전	3회 이내
상추 (양상추 포함)	흰가루병	발병 초 경엽처리	10mL	수확 7일 전	2회 이내
수박 (복수박 포함)	덩굴마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	4회 이내
	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
속 영경귀	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
오이	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	40mL (150mL/주)	정식기	1회 이내
		정식 전 관주처리			
	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 5일 전	3회 이내
왕고들빼기		발병 초 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내



원예용 살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
잔디	동전마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	발병초기	-	
	라이족토니아마름병	발병 초 7일 간격 관주처리	6.7mℓ(1ℓ / m <sup>2</sup> )		-	
	여름잎마름병(썸머패취)	발병 초 관주처리			-	
참깨	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	3회 이내	
참외	흰가루병			수확 2일 전		
토마토(방울토마토 포함)	잎곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전		
	잿빛곰팡이병					
파	흰가루병	발병 초 경엽처리				
포도	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전		
향미나리(파슬리)	흰가루병	발병 초 경엽처리				2회 이내
호박(단호박 포함)		발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 3일 전		3회 이내

### 주의사항

- ▶ 추천약량 초과 사용 시 엽갈변 등 약해 위험이 있습니다.
- ▶ 흰가루병 약제는 다발생기 살포시 내성균 발현이 빠르므로 타 계통 약제(시위내플러스 유제 등)와 번갈아 사용해 주시기 바랍니다.
- ▶ 전착제와 혼용시 약해가 발생하므로 혼용하지 마십시오.



원예용  
살균제