

강력한 치료효과와 원예용 살균제

살림꾼

입상수화제



예방효과 및 치료효과
트리아졸계 살균제로 뛰어난 예방 및 치료효과(치료효과>예방효과)

넓은 항균 스펙트럼
자낭균류, 담자균류, 불완전균류 등에 높은 항균활성

긴 약효 지속시간
약제 살포 후의 잔효성(15~20일)이 길어 우수한 방제효과를 발휘

품목명 : 메트코나졸 (20%) | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 170g x 40EA | 작용기작 : 사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함) 대추	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	6.7g	수확 14일 전	3회 이내
	탄저병				
마늘	녹병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7g(1ℓ/m ²)	수확 7일 전	1회 이내
매실	흑색씩음균핵병	중구 파종직전 토양처리		파종기	
모과	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7g	수확 21일 전	3회 이내
배	검은별무늬병			수확 14일 전	
블루베리	탄저병	발병 초 10일 간격 4회 경엽처리	6.7g	수확 30일 전	1회 이내
사과	갈색무늬병			6월 상순부터 10일간격	
석류	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7g	수확 21일 전	3회 이내
양앵두(체리)					
유자					
참다래(키위)	녹병	발병 초 10일 간격 3회 경엽처리	6.7g	수확 7일 전	3회 이내
파(쪽파 포함)					

효과적인 사용방법

마늘 흑색씩음균핵병 방제 : 마늘을 파종할 두둑을 만든 후 파종구를 파고 약액이 파종구에 충분히 묻도록 살포한 후 종구를 심고 복토하면 병해방제에 효과적입니다.

방제효과

마늘 녹병 (2008, 순천대학교)

살림꾼 91.2%

대조약제 78%



원예용 살균제

123 | 살림꾼 입상수화제