

흰잎마름병·잎집무늬마름병·도열병동시방제

# 여의봉

액상수화제



- ▶ 벼의 병해저항성을 유도하는 티아디닐은 벼 생육 초기 살포로 후기 흰잎마름병, 도열병까지 예방
- ▶ 잎집무늬마름병 전문약제 티플루자마이드
- ▶ 액상수화제로 다양한 살포기기로 사용가능

품목명: 티플루자마이드+티아디닐 (3.5+15)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 500ml x 20EA, 1ℓ x 15EA | 작용기작: 다2+차3

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
벼	깨씨무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 30일 전	3회 이내
	목도열병	출수 7일 전 경엽처리			
	세균벼알마름병	출수직전부터 7일 간격 경엽처리			
	이삭누룩병	출수 7일 전 7일 간격 경엽처리			
	잎도열병	발병 초 경엽처리			
	잎집무늬마름병	유수형성기 및 수잉기 경엽처리			
	키다리병	출수 7일 전 7일 간격 경엽처리	100ml/10a		
	흰잎마름병	발병직전 7일 간격 경엽처리			
	세균벼알마름병(무인항공기)	출수직전부터 7일 간격 경엽처리			
	잎집무늬마름병(무인항공기)	유수형성기 및 수잉기 경엽처리			
	흰잎마름병(무인항공기)	발병직전 7일 간격 경엽처리			



수도용  
살균제

22 | 여의봉 액상수화제

## 효과적인 사용방법

▶ 액상수화제 약제로서 사용전에 충분히 흔들어서 사용하여 주십시오.

## 방제효과 시험

▶ **흰잎마름병** (2010, 동방아그로)



▶ **문고병** (2010, 한국환경연구소)



## 대상 병해



▲ 도열병



▲ 흰잎마름병



▲ 문고병