

일등탄

액상수화제



과수 주요병해에 강력한 방제효과
 트리아졸계, 스트로빌루린계의 혼합제로서 상승효과를 나타내어
 내성 병원균에도 우수한 방제효과 발휘

빠른 효과
 약제 살포 후 수초 내에 병원균 활동을 억제하므로 병 진전이 확연하게 저지됨

우수한 내우성과 긴 약효지속기간!

품목명: 메트코나졸+피라클로스트로빈 (8+9)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 100mL x 100EA, 250mL x 40EA | 작용기작: 사1+다3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전	3회 이내
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
고추(단고추류 포함)	그을음병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
	탄저병			수확 7일 전	2회 이내
다래	녹병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
	탄저병			수확 7일 전	3회 이내
대추	녹병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
	탄저병			수확 7일 전	2회 이내
마늘	녹병	발병 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
	잎마름병			수확 14일 전	3회 이내
망고	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
매실	검은별무늬병	4월 중순부터 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
모과	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
				수확 14일 전	2회 이내
무화과	검은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
배	탄저병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
복분자	탄저병	발병 초 경엽처리	수확 3일 전	2회 이내	
복숭아	잣빛무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	
블루베리	탄저병	발병 초 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 7일 전	2회 이내	
	검무늬씩음병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	수확 3일 전	3회 이내	
사과	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 21일 전	3회 이내	
	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	수확 7일 전	2회 이내	
	발병 초 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내		
산딸기	잣빛무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	
살구	탄저병	발병 초 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
	열매씩음병	착과기부터 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	
석류	탄저병	발병 초 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	
앵두	탄저병	발병 초 경엽처리	수확 7일 전	3회 이내	

원예용
살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
양앵두(체리)	탄저병	발병 초 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	3회 이내
양파	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리		10mℓ(150ℓ/10a)	
	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 21일 전		
	흑색썩음균핵병	월동 후 10일 간격 경엽처리			
유자	탄저병	발병 초 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전	
인삼	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 50일 전	
	탄저병				
자두	갯빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	
	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	
참다래(키위)	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전	
콩				발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 21일 전
파(쪽파 포함)	녹병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	
포도	갯빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			

작용기작

트리아졸계
메트코나졸

강력한 예방/치료 효과
[치료 효과] 예방 효과

+

스트로빌루린계
피라클로스트로빈

뛰어난 약효 발현
넓은 항균 스펙트럼

