

# 찬찬

입상수화제



**원예 종합살균제**  
과수의 갈색무늬병, 탄저병 고추의 탄저병 등 여러 작물의 다양한 병해에 효과 발휘

**치료와 예방효과를 겸비**  
트리플록시스트로빈의 치료 효과와 이프로디온의 예방 효과의 절묘한 조합

**저항성 곰팡이에 안정적 효과**  
최근 EBI계통과 스트로빌루린계통의 저항성이 생긴 곰팡이에도 안정적인 효과 발휘

품목명: 이프로디온+트리플록시스트로빈 (30+8)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 200g x 40EA, 500g x 20EA | 작용기작: 마3+다3

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감귤	검은점무늬병	6월 상순부터 2주 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	3회 이내
	더덩이병	춘지발생 초 15일 간격 경엽처리			
	젓빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병 초 10일 간격 4회 경엽처리		수확 2일 전	
	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
금감(금귤)	검은점무늬병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	
대추	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		육묘상	
딸기	탄저병(육묘상)	발병 초 7일 간격 경엽처리			
매실	검은별무늬병	4월 중순부터 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	4회 이내
	젓빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
	탄저병				
배	검은별무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
	붉은별무늬병				
복숭아	젓빛무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
	탄저병				
사과	갈색잎마름병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	-	
	겉무늬씩음병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
	점무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리			
수박(복수박 포함)	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
유자	더덩이병	춘지발생시 경엽처리			
인삼	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 21일 전		
잔디	갈색잎마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20g(1ℓ/㎡)	발병 초	-
	동전마름병	발병 초 10일 간격 3회 경엽처리	20g		-
	라이족토니아마름병	발병 초 7일 간격 관주처리	20g(1ℓ/㎡)		-
포도	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 4회 경엽처리	20g	수확 21일 전	4회 이내
	새눈무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	젓빛곰팡이병				
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			



원예용 살균제