

탄저병에 강한 종합살균제

탄저왕

액상수화제



- ▶ **탄저병 전문약제**
사과와 고추의 탄저병을 효과적으로 치료 및 예방
- ▶ **저항성 관리에 용이**
서로 다른 계통의 이상적인 조합으로 저항성 곰팡이에도 안정적인 효과 발휘
- ▶ **케어스와 혼용시 상승효과 발휘**
사과, 고추의 탄저병 방제 시 케어스와 혼용하면 탄저병을 효과적으로 치료 및 예방

품목명: 클로로타로닐 + 피라클로스트로빈 (25+8) % | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 135ml x 80EA, 330ml x 40EA | 작용기작: 카+다3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준		
				시기	횟수	
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 4회 경엽처리	13.3mℓ	수확 14일 전	3회 이내	
		6월 상순부터 10일 간격 경엽처리				
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병 초 10일 간격 4회 경엽처리		수확 3일 전		
		발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내	
				수확 7일 전	3회 이내	
				수확 21일 전	2회 이내	
				수확 7일 전	3회 이내	
복숭아	잎마름병	발아직전 및 꽃피기 직전 경엽처리		13.3mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	노균병					
	탄저병					
사과	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	13.3mℓ	수확 21일 전	3회 이내	
	검무늬썩음병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리				
	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리				
살구	잿빛무늬병	발병 초 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	-	
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
수박	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ (1ℓ / m ²)	수확 14일 전	-	
	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
양파	탄저병	발병 초 10일 간격 3회 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	-	
	동전마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
인삼	탄저병	발병 초 7일 간격 3회 관주처리	10mℓ	발병 초	-	
		발병 초 14일 간격 관주처리				
		발병 초 10일 간격 경엽처리				
		발병 초 10일 간격 경엽처리				
자두	여름잎마름병(썸어패취)	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	2회 이내	
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
참깨	동전마름병	발병 초 7일 간격 3회 관주처리	10mℓ	발병 초	-	
	여름잎마름병(썸어패취)	발병 초 14일 간격 관주처리				
포도	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	13.3mℓ	수확 14일 전	3회 이내	
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리				



원예용
살균제

148 | 탄저왕 액상수화제

고추 탄저병



▲ 탄저왕



▲ 무처리

사과 탄저병



▲ 탄저왕



▲ 무처리

* 보조제로는 고착제(케어스)와 혼용 살포하시면 강우시 효과적입니다.

탄저병 발병의 주요 원인인 비에 대한 효과적 예방책: "2+1" 효과



주의사항

알칼리성약제(석회유황합제, 석회보르도액)와 혼용하거나 1주일 이내 근접살포 할 경우 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

