

# 포룸

액상수화제



- ▶ **역병, 노균병에 강력한 효과**  
곰팡이의 세포벽을 직접 파괴 또는 세포벽 형성을 저해하는 강력한 효과
- ▶ **우수한 내구성**  
강력한 침투이행성으로 강우시에도 안정적인 효과 발휘
- ▶ **환경에 안전**  
자연환경에서 쉽게 분해되어 잔류 걱정이 없고, 인축, 천적 및 꿀벌 등에 안전

품목명 : 디메토모르프 (18) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 200ml x 40EA | 작용기작 : 아5

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
갓	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전	3회 이내
고들빼기					
고추(단고추류 포함)	역병	장마직전부터 7일 간격 경엽처리 발병직전 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내 1회 이내
고추(잎)					
근대	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리 발병 초 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내 3회 이내
꽃양배추(잎)					
냉이					
녹색꽃양배추(브로콜리)					
들깨(잎)	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
로켓(루꼴라)					
머루	역병	발병 초 10일 간격 경엽처리 발병 초 경엽처리		수확 30일 전 수확 7일 전	3회 이내
배암차즈기(곰보배추)					
배추	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전 수확 14일 전	2회 이내
부추					
블루베리	역병	발병 초 10일 간격 경엽처리 발병 초 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
상추					
상추(양상추 포함)	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전 수확 7일 전	2회 이내
순무유채					
시금치	노균병	발병 초 경엽처리		수확 2일 전	3회 이내
속갓					
양배추	역병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 60일 전	-	
양파					
오이	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리 발병 초 경엽처리	수확 5일 전	3회 이내	
인삼					
장미	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리 발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
참외					
파(쪽파 포함)	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
포도					

원예용  
살균제

150 | 포룸 액상수화제