

프라우스

유제



- ▶ 과수 중기 및 후반기 노린재 및 나방류 해충 방제 전문
- ▶ 과수 노린재를 효과적으로 막을 수 있는 제형
- ▶ 멸구류 및 흑명나방 등 나방 동시방제

품목명: 크로마페노자이드 + 에토펜프록스 (3+10) % | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 II 급 | 포장단위: 500mL x 20EA | 작용기작: 18+3a

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용시기 및 방법	물 20L당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
감(단감 포함)	감꼭지나방	발생 초부터 경엽처리	20mL	수확 21일 전	3회 이내	
	툽다리개미허리노린재					
감귤	썩덩나무노린재			수확 14일 전	2회 이내	
고추(단고추류 포함)	담배나방			수확 3일 전		
	다래	툽다리개미허리노린재	수확 7일 전			
밤	복숭아명나방	산란기부터 경엽처리(ULV)	666.7mL(3L/10a)		3회 이내	
배	갈색날개매미충	발생 초부터 경엽처리	20mL	수확 21일 전	2회 이내	
	미국선녀벌레					
	애모무늬잎말이나방					
배추	비단노린재			수확 14일 전		
복숭아	복숭아순나방	발생 초부터 경엽처리	20mL	수확 3일 전	2회 이내	
	썩덩나무노린재					
	갈색날개매미충					
사과	사과굴나방			발생 초부터 경엽처리		20mL
	썩덩나무노린재					
	콩	툽다리개미허리노린재	수확 14일 전		3회 이내	
포도	꽃매미					
		애무늬고리장님노린재				

대상해충별 방제시기

작물명	대상해충	방제시기	피해특징																	
			<ul style="list-style-type: none"> • 주로 꼬투리가 생기면서 가해시작 ▶ 쪽정이가 됨 • 과일 흡즙 ▶ 피해부위가 스폰지처럼 되어 조직파괴 및 부패함 • 알에서 부화하여 7~8월에 성충발생 ▶ 수확기까지 피해를 줌 																	
작물명	대상해충		5월			6월			7월			8월			9월			10월		
			상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순	상순	중순	하순
과수(사과, 복숭아, 감 등)	툽다리개미허리노린재	1차: 5월 하순 2차: 7월 하순 3차: 10월 중순																		
	썩덩나무노린재	1차: 6월 중순 2차: 9월 상순																		
과수(사과, 복숭아, 감 등)	툽다리개미허리노린재				1차															3차
	썩덩나무노린재					1차										2차				

청출어람

프라우스



원예용 살충제

250 | 프라우스 유제