

혜성

입상수화제



스트로빌루린계와 트리아졸계 약제의 합제
크레속심메틸과 메트코나졸의 혼합제로서 예방 및 치료효과를 겸한 약제입니다.

크레속심메틸의 특이한 확산침투성과 침달효과
크레속심메틸은 표면확산침투성과 침달효과가 우수하여 작물 전체에 고른 효과를 보입니다.

메트코나졸의 강력한 세포막 생합성 저해 효과
메트코나졸은 포자발아, 균사신장, 부착기형성, 균사의 조직내 침입을 강력히 억제합니다.

뛰어난 약효 지속성과 내구성
약효지속성이 우수하고 내구성이 뛰어나 안정된 효과를 발휘합니다.

품목명: 크레속심메틸 + 메트코나졸 (20+10) % | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 250g x 40EA | 작용기작: 다3+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준		
				시기	횟수	
감(단감 포함)	동근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내	
감귤	더듬이병 젓빛곰팡이병	춘지 발생 초 15일 간격 경엽처리		수확 7일 전		
마늘	녹병 잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g(1ℓ / m ²)	수확 14일 전	3회 이내	
	흑색썩음균핵병	종구 파종직전 토양처리			4회 이내	
배	검은무늬병 검은별무늬병 붉은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 21일 전	5회 이내	
	복숭아	젓빛무늬병		발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	4회 이내
	사과	갈색무늬병 겉무늬썩음병 점무늬낙엽병		발병 초 10일 간격 경엽처리 6월 상순부터 10일 간격 경엽처리 발병 초 10일 간격 경엽처리		
양파		탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리			
인삼		노균병 젓빛곰팡이병 점무늬병 탄저병	발병 초 7일 간격 경엽처리 발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 50일 전		
	파	흑색썩음균핵병	정식 전 토양처리	정식기	1회 이내	
	포도	갈색무늬병 새눈무늬병 탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리 발병 초 7일 간격 경엽처리 발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내

